

Difterie - Tetanus	Herhaling om de 10 jaar, of men op reis gaat of niet. Difterievaccin is onontbeerlijk voor de vroegere Oostbloklanden.
Teken-encefalitis	Reizigers naar landen in Centraal-Europa, die in contact komen met teken (kampeerders). Twee doses met 1 maand interval. Bescherming: 3 jaar.
Japanse encefalitis	Verblijf van meer dan een maand op het platteland in Aziatische landen (van Indië tot Japan) vanaf de leeftijd van 1 jaar. Bescherming: 3 jaar.
Gele koorts	Verplicht of sterk aangeraden voor alle landen van Zwart-Afrika of Zuid-Amerika. Bescherming: 10 jaar.
Tyfus	Als de voedingshygiëne niet verzekerd is. Kan vanaf de leeftijd van 4 jaar gegeven worden. Bescherming: 3 jaar.
Griep	Risicopersonen, met inbegrip van deze die zich naar gematigde streken van het zuidelijk halfrond begeven tussen <u>april en september</u> .
Hepatitis A	Als de voedingshygiëne niet verzekerd is, vanaf de leeftijd van 10 jaar. Eén dosis, herhaald na een jaar. Bescherming: 10 jaar.
Hepatitis B	Voor elk lang verblijf in een ontwikkelingsland, of indien <u>seksueel risicogedrag</u> of medisch beroep.
Meningokokkenmeningitis	Verblijf van meer dan één maand in plattelandsstreken van de hierboven vermelde landen. Vermijdt niet dat men drager kan zijn. Bescherming: 3 jaar.
Poliomyelitis	Als de voedingshygiëne niet verzekerd is. Herhaling om de 10 jaar. inspuitable vorm indien de vaccinatioestand onbekend is of primovaccinatie.
Pneumokokken	Risicopersonen <u>in elk jaargetijde</u> . Bescherming: 5 jaar.
Hondsdolheid	Preventieve vaccinatie enkel voor risicogroepen: wielertoeristen, dierenartsen, landbouwkundigen, speleologen...
Bof-Mazelen-Rubella	Mono- of zelfs trivalent vaccin wordt aangeraden voor alle niet-immune volwassenen.
	Vooral voor kinderen, soms volwassenen, die zich naar een